



Nytt om ICD-10 og NCMP for 2014

Øystein Hebnes, avdeling statistikk og kodeverk

ICD-10

Nye koder for mikrometastaser

C77 Metastase og uspesifisert ondartet svulst i lymfeknuter

C78 Metastase i åndedrettsorganer og fordøyelsesorganer

C79 Metastase med annen og uspesifisert lokalisasjon

Alle firetegnskoder i disse kategoriene får en underinndeling med 5. tegn 0 som brukes ved mikrometastase i stedet for vanlig metastase. F.eks. kodes da vanlig metastase i lymfeknute på hals **C77.0**, mens mikrometastase kodes **C77.00**.

ICD-10

Opprydding i kapittel XIII (M-koder)

De fleste koder i kapitlet har en frivillig underinndeling med 5. tegn etter lokalisasjon i kroppen. Vi har gjennomgått kodene og fjernet 5-tegnskodene som ikke gir anatomisk mening, f.eks.

M54.26 Smerte i nakke i lumbalregionen

Tilsvarende har en del koder som ikke hadde det fra før fått 5-tegnsinndeling der det gir mening, f.eks.

M67.3 Forbigående synovitt

ICD-10

Q85.0 Nevrofibromatose

Koden får frivillig 5-tegnsinndeling for å kunne skille de to typene av sykdommen:

Q85.01 Nevrofibromatose type 1

Q85.02 Nevrofibromatose type 2

ICD-10

Z03.9 Observasjon ved mistanke om uspesifisert sykdom eller tilstand

Z04.9 Undersøkelse og observasjon av uspesifisert årsak

Disse kodene brukes en del men gir ingen meningsfull informasjon om pasienten og fjernes fra 2014. Har man ingen sykdom å kode skal man i stedet bruke det viktigste symptomet eller en annen mer spesifikk kontaktårsak som hovedtilstand

ICD-10

Z22.30 Latent tuberkulose

Ny kode for å kunne registrere pasienter som er smittet med og bærere av tuberkulosebakterier uten å ha klinisk sykdom

ICD-10

Z37 Resultat av forløsning

Presisering av bruk: en av kodene herfra skal *alltid* tas med ved fødselsopphold fra 2014, enten som kode for hovedtilstand eller annen tilstand. Dette for å kunne lage statistikk over fødsler som har funnet sted ved institusjoner. Hjemme- og transportfødsler vil likevel ikke komme med i slik statistikk.

ICD-10

Z00.11 Rutinemessig helseundersøkelse av nyfødt

Helseundersøkelse av barn under 29 dagers alder

Ny 5-tegnskode Kommentar: til bruk ved polikliniske besøk eller innleggelser etter fødeoppholdet hovedsakelig for rutinemessig helseundersøkelse. Også ved overflytning til annen avdeling etter ukomplisert fødsel.

NCMP

Ny kode for hypnose i klinisk bruk

AXGX00 Hypnoterapi

Inkl: brukt i smertebehandling, psykoterapi og opplæring i selvhypnose

Har hittil manglet i norsk prosedyrekodeverk

NCMP

Oppdeling av

EBGC00 Tilpasning av bittskinne

i to nye koder:

EBGC01 Tilpasning av bittskinne mot tanngnissing (bruxisme)

EBGC02 Tilpasning av apnéskinne

NCMP

Nye koder for kontroll av kunstig hjertepumpe

FPGT30 Kontroll av venstresidig kunstig hjertepumpe (LVAD)

FPGT32 Kontroll av høyresidig kunstig hjertepumpe (RVAD)

NCMP

Ny kode for en type assistert ventilasjon på respirator

GXAV23 Høyfrekvent oscillatorventilasjon

Her brukes ikke vanlige inn- og utblåsninger men et konstant lufttrykk med små meget raske trykkvariasjoner (opptil 900x/minutt). Andre typer høyfrekvent ventilasjon kodes som før **GXAV24 Respiratorbehandling med høyfrekvensventilasjon.**

NCMP

Ny kode til bruk ved intensivbehandling

GXGX00 Bukleiebehandling ved ARDS

Respiratorbehandling i bukleie. Brukes i tillegg til annen kode for respiratorbehandling.

Ikke det samme som snuing av ulike årsaker, f.eks. for å hindre liggesår

NCMP

Endring av koder for sedering:

WDAJ Sedering

Evt. teknikk for ventilering angis med ZWWB00 eller ZWWB01

WDAJ05 Sedering under overvåking

WDAJ10 Våken sedering med injeksjonsmidler

WDAJ15 Dyp sedering

Utført av anestesilege eller anestesisykepleier

WDAJ Sedering

Evt. teknikk for ventilering angis med ZWWB00 eller ZWWB01

Bruk om mulig ATC-kode for medikament som tilleggskode

WDAJ11 Våken sedering

WDAJ15 Dyp sedering

Redusert bevissthetsnivå med delvis tap av beskyttende reflekser

NCMP

Nye koder for partikkelstråleterapi

WEOC00 Protonterapi

WEOC10 Karbonterapi

Utføres foreløpig ikke i Norge men kan etter egne regler gitt av Helsedirektoratet brukes for pasienter som har mottatt slik behandling i utlandet

NCMP

Koder som utgår

WBG72 Intraartikulær injeksjon av legemiddel

Bruk i stedet mer spesifikke NCSP-koder **TEG 10** eller **TNx 11** med 3. tegn A-H, som beskriver injeksjon i bestemte ledd

WDAB55 Ekstrakorporal membranoksygenering

Identisk med **FXE 00** **Bruk av ECLA** som skal brukes i stedet

KODEVEILEDNING 2014

*Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten
ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014.*

Statistikk
ICD-10
Rehabilitering
NCSP
Hovedtilstand
Psykisk helsevern
Helsedirektoratet
Kodeveiledning
2014

Foreløpig utgave er publisert
på www.kith.no/kodeveiledning

Kodeveiledning

Kapittel 2 Valg av hovedtilstand og andre tilstander:

Utvidelser og presiseringer i avsnittene *Symptomer og bakenforliggende tilstand* og *Internasjonale forskjeller*

Kapittel 4 Viktige begreper og prinsipper og praktisk fremgangsmåte ved koding:

Nytt avsnitt side 36 om Koding av medikamentbivirkninger.
Kodes med mest mulig spesifikk kode etterfulgt av Y4n.

Kodeveiledning

Kjemoterapi, flere kapitler:

Z51.1x-kodene brukes nå for annen tilstand når aktuelt, ikke lenger for hovedtilstand.

WBOC-kodene (ikke WBGM-kodene) i NCMP skal brukes sammen med ATC-koder når ikke kur-id brukes

Kapittel 19 Mindre kodingstemaer: diverse nye temaer

Achillesseneruptur: koding ved hhv. traumatisk og spontan ruptur

Kodeveiledning

Kapittel 19 Mindre kodingstemaer: diverse nye temaer

Achillesseneruptur:

koding ved hhv. traumatisk og spontan ruptur

Anemi som skyldes svulster eller andre kroniske sykdommer:

1. Sykdommen
2. Tilleggskode: D63.0 * Anemi ved neoplastisk sykdom eller D63.8 *
Anemi ved andre kroniske sykdommer klassifisert annet sted
3. Tilleggskode: typen anemi

Bruddkontroller:

Se senere lysbilde etter NCSP

Etterbehandling etter ACB, klaffekirurgi eller innleggelse av pacemaker/ICD:

Diagnosekoding etter overflytting etter disse typene behandling

Kodeveiledning

Kapittel 19 Mindre kodingstemaer: diverse nye temaer

Mutasjoner:

ICD-10 har ingen koder for mutasjoner. Mulig koding hos pasienter med mutasjoner.

Pacemakerkontroller:

Hovedsakelig om valg av diagnosekode

Periprotetisk hoftefraktur:

Valg av diagnosekode ved hoftefraktur hos pasienter med protese

Pleuravæske ved cancer:

Valg mellom to diagnosekoder avhengig av om det er malign eller paramalign væske

Kodeveiledning

Nye kodespesifikke/kapittelspesifikke merknader:

- P00-P04 Foster og nyfødt påvirket av faktorer hos mor og av komplikasjoner under svangerskap, fødsel og forløsning
- R77 Andre abnormiteter i proteiner i plasma
- Z00.11 Rutinemessig helseundersøkelse av nyfødt
- Z25.1 Behov for immunisering mot influensa
- GXAV Assistert ventilasjon
- TNA 11, TNB 11, TNC 11, TND 11, TNE 11, TNF 11, TNG 11, TNH 11
- WBOC Cytostatikaterapi



Nyheter NCSP 2014

Kodeverket og kodeveiledningen

Hanne Osnes-Ringen, avdeling statistikk og kodeverk

NCSP

- **ZSX05 Sekundær operasjon pga. lokalt residiv**
- **ZSX10 Sekundær operasjon med utvidet reseksjon med frie render**
- **ZSX15 Sekundær operasjon med utvidet reseksjon pga. manglende frie render**

- Erstatte koden
- ZSX01 Sekundær operasjon pga. lokalt residiv eller ufullstendig radikalitet

NCSP

- **JDD01 Laparaskopisk total gastrektomi med øsofagojejunostomi (Roux-en-Y)**
- **XJD05 Endoskopisk ultralyd med finnålsaspirasjonscytologi**

NCSP

- **KAS13 Transplantasjon av nyre fra avdød donor med mini invasiv teknikk**
- **KAS23 Allogen transplantasjon av nyre fra levende donor med mini invasiv teknikk**

NCSP

- **JAB03 Lukket reponering av lyskebrokk**
- **JAC03 Lukket reponering av lårbrokk**
- **JAF03 Lukket reponering av navlebrokk**
- Undertekst: Kodes ikke ved samtidig åpen kirurgi

NCSP

- **FKC72 Perkutan transluminal innsetting av mitralimplantat**
- Kommentar:
- Operasjon for mitral insuffiens med clips
- Ny operasjonsteknikk, perkutant, tidligere kodet dette FKC96 og FKD96

NCSP

- KCC01 Laparoskopisk cystektomi
- KCC11 Laparoskopisk cystoprostatektomi
- KCC21 Laparoskopisk cystoprostataourethrektomi
- KCC31 Laparoskopisk cystektomi med eksisjon av kvinnelige genitalia interna
- KCC97 Annen laparoskopisk cystektomi
- KDG70 Urethropeksi med slynge
- KBJ 11 Laparoskopisk kutan ureteroenterostomi
- KDK01 Laparoskopisk implantasjon av sfinkterprotese på blærehals
- KFH01 Laparoskopisk operasjon for retinert eller ektopisk testikkel

NCSP

- JJB 01 Laparoskopisk kilereseksjon av lever
- JJB 11 Laparoskopisk atypisk leverreseksjon
- JJB 41 Laparoskopisk eksisjon av leversegmentene II, III og IV
- JJB 51 Laparoskopisk eksisjon av leversegmentene V, VI, VII og VIII
- JJB 54 Laparoskopisk eksisjon av leversegmentene IV, V, VI, VII og VIII
- JJB 61 Annen laparoskopisk reseksjon av tre eller flere leversegmenter
- JJB 97 Annen laparoskopisk leverreseksjon
- JLC31 Laparoskopisk pankreatoduodenektomi
- Utgår: JJB 71 Laparoskopisk leverreseksjon

NCSP

- Endring i tekst
- Ordet **kadaver** er endret til **avdød**
- Eks.
- **KAS 10 Transplantasjon av nyre fra kadaverdonor**
- Kodeteksten endres til:
- **Transplantasjon av nyre fra avdød donor**
- **Nerve modulering** endret til **nevromodulering**
- Endringer i undertekster

Nytt i kodeveiledningen NCSP 2014

- Brudd skal kodes med S kode ved primærbehandling
- I oppfølgingsperioden, inklusive ved gipsskifte skal det kodes med Z kode selv om bruddet ikke er tilhelet
- Der det kodes med en S kode er det også obligatorisk med årsaks koding (ingen ny kodingsregel)

